

Reconnaitre l'ambrosie

(*Ambrosia artemisiifolia*, Ragweed)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Inflorescences mâles



Inflorescences femelles

Les graines se forment au niveau des fleurs femelles, situées à l'aisselle des feuilles.



Tige

La tige est poilue.

Les plantes adultes peuvent, selon les lieux, mesurer de 30 à 150 cm. Lorsqu'elle a suffisamment d'espace, la plante se ramifie et peut former de nombreuses hampes florales.

L'ambrosie est une nouvelle mauvaise herbe qui se propage, d'avril à septembre, sur les surfaces qui ne sont que partiellement recouvertes de végétation. Le pollen de l'ambrosie provoque des allergies chez de nombreuses personnes. Pour limiter son impact, il

convient de reconnaître exactement la plante et de l'éliminer. Dans les endroits propices, quelques plantes isolées peuvent engendrer en peu d'années d'importants peuplements.



Des plantules peuvent être observées de la mi-avril au début du mois de septembre. La période principale de germination s'étend de la mi-avril à la mi-juin; mais après un travail du sol, de nouvelles germinations peuvent avoir lieu jusqu'au début du mois de septembre.



Fin mai, les premières plantes atteignent 10–15 cm de hauteur



En juin, la plante forme des rameaux latéraux et pousse en hauteur

Que faire si je trouve une plante d'ambroisie?

- Avertir l'autorité communale compétente. Lui donner, pour assurer la détermination, un échantillon de plante dans un sac en plastique transparent.
- Arracher la plante et la jeter aux ordures. Lors de fortes infestations, ou en cas de présence dans des parcelles agricoles, avertir la station phytosanitaire cantonale.
- Lorsque les plantes sont en fleurs, porter un masque à poussières et des gants lors de l'arrachage.



En juillet, les plantes les plus précoces commencent à fleurir; les inflorescences deviennent visibles.



La période principale de floraison s'étend d'août à septembre; mais les plantes les plus tardives peuvent fleurir jusqu'en octobre.



Les premières graines mûrissent au début du mois de septembre.

Ne pas confondre l'ambroisie avec l'armoise

Ambroisie

- Se développe tard et lentement (10–15 cm à fin mai)
- Fleurs vertes, principalement en août
- Les feuilles froissées (avec des gants!) sentent l'herbe
- Face inférieure des feuilles verte

Armoise

- Fin mai: 25–50 cm de hauteur
- Les fleurs s'ouvrent dès la fin juin
- Les feuilles froissées dégagent une odeur aromatique
- Face inférieure des feuilles blanchâtre

A qui annoncer les foyers d'ambroisie?

Station phytosanitaire

BE 031 9105153
FR 026 3055865
GE 022 3887130
JU 032 4207420
NE 032 8540582/83
VD 021 9953499/34
VS 027 6067600

Edition

Auteurs: Texte et conception Popow Agro Consulting, Lindau.

Première page: R. Gämperle, Strickhof. Collaboration, pour la mise en page et la recherche des illustrations: Denise Frei, Strickhof
Illustrations: M. Hochstrasser et R. Gämperle, Strickhof.
Ch. Bohren et N. Delabays, Agroscope ACW, Ch. Kuendig, SPP VD et M. Horner, SPP NE.

Face supérieure de la feuille.



Face inférieure de la feuille.

